



BULETIN TESTARI EFICACITATE

DESCRIERE PRODUS

KLINTENSIV® ALCHOSEPT este o soluție hidroalcoolică folosită pentru dezinfectarea și menținerea igienei în scopul dezinfectiei tegumentare prin frecare. Pentru uz profesional, populație.

KLINTENSIV® ALCHOSEPT are acțiune rapidă, fiind un produs ideal pentru utilizări frecvente în cabinetele medicale, între pacienți. Substanțele protectoare și hidratante pentru epidermă asigură echilibrul lipidic prevenind apariția zonelor uscate și senzația de piele crăpată după utilizări multiple, într-un interval de timp relativ mic. Se poate utiliza pentru: dezinfectia igienica si/sau chirurgicala a mainilor prin frecare, dezinfectia tegumentara inainte de punctii/injectii/recoltari de sange, dezinfectie tegumentara in institutii/ zone cu risc mare de epidemii.

COMPOZITIE CHIMICA

Substanțe active:

- Ethanol, CAS 64-17-5; CE 200-578-6

Alte ingrediente: Emolient, parfum, colorant și apă

EFICACITATE BIOCIDĂ

KLINTENSIV® ALCHOSEPT			AVIZ NR. 4217BIO/01/12.24		
Activitate biocidă	Standard	Condiții testare	Organism testat	Concentrație	Timp contact
BACTERICIDA	SR EN 1500	Murdarie	Escherichia coli K12 NCTC 10538	3ml	30 secunde
BACTERICIDA	SR EN 13727	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Enterococcus hirae ATCC 10541 Escherichia coli ATCC 10536	ca atare	30 secunde
BACTERICIDA	SR EN 12791	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Enterococcus hirae ATCC 10541 Escherichia coli ATCC 10536	2x3ml	3 minute
FUNGICIDA	SR EN 13624	Curătenie	Aspergillus niger ATCC 16404	ca atare	60 secunde
LEVURICIDA	SR EN 13624	Curătenie	Candida albicans NCPF 3179	ca atare	60 secunde
MICOBACTERICIDA TUBERCULOCIDA	SR EN 14348	Curătenie	Mycobacterium avium ATCC 15769 Mycobacterium terrae ATCC 15755	ca atare	60 secunde
VIRUCIDA	SR EN 14476	Murdarie	Poliovirus type 1 Murine Norovirus Adenovirus type 5	ca atare	3 minute

MOD DE UTILIZARE

Se utilizează ca atare.

Pentru dezinfectia igienica a mainilor: se aplica 3 ml (o apăsare de pulverizator) și se freacă mainile timp de 30 secunde.

Pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor se folosesc 6 ml pentru 3 minute timp de contact astfel:

- se aplica 3 ml (o apăsare de pulverizator), se freacă mainile timp de 60 secunde,
- apoi se mai adaugă 3 ml (inca o apăsare) și se mai freacă mainile timp de 120 secunde.